



Edition
Cultures Spéciales

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

REGION CENTRE

SUPPLEMENT N° 27 AU BULLETIN TECHNIQUE N° 17

15 JUIN 1994

- EDITION CULTURES LEGUMIERES 14 -

CORNICHON**ASPERGE****POIREAU****CHOUX-FLEURS****CAROTTE****POMME de TERRE****MAIS DOUX****INFO FLASH**

- : Mildiou : Lutte préventive régulière.
- : Stemphyliose : Premières taches présentes.
- : Teigne : Intervenir dès la fin de semaine.
- Rouille : Premières taches orangées sur jeunes plants (77).
- : Pucerons : Maintenir la protection.
- Mildiou : Traitement préventif dès la levée.
- : Mouche de la carotte : Réduction du vol.
- Alternariose : Assurez la protection du feuillage.
- : Mildiou : Poursuite des contaminations.
- : Pyrale : Les premières nymphoses.

CORNICHON

Mildiou :

Pseudoperonospora cubensis

Les attaques de Mildiou provoquent des nécroses du feuillage dont le développement grille rapidement toute la culture. Les taches foliaires anguleuses, strictement délimitées par les nervures, apparaissent vert plus clair ou jaunâtre à la face supérieure. L'observation, le matin à la rosée, révèle un aspect huileux à la face inférieure sur laquelle le champignon fructifie en formant un duvet violacé. L'épidémie est favorisée par des températures élevées (23° C). Sa propagation est faite par les pluies, les rosées se prolongeant dans la matinée, ainsi que l'irrigation par aspersion en début de matinée. Le contrôle de la maladie est réalisé par la lutte préventive en conditions climatiques favorables dès la fin Juin ou à l'apparition des premiers symptômes. Le renouvellement est effectué suivant la rémanence des produits autorisés utilisés (voir tableau suivant) :

Cornichon : Traitement des parties aériennes

Mildiou

Matière active	Spécialité	Dose/ha	Délai
chlorothalonil	Nombreuses		3 j
mancozebe	Nombreuses		3 j
manebe	PRODANATE 80	2,0 KG	3 j
mancozebe et phosetyl-aluminium	RHODAX	3,5 KG	7 j
manebe et metalaxyl	ACYLON TC	2,0 KG	3 j

ASPERGE

Stemphyliose :

Les premières contaminations sont observées dans de nombreuses parcelles en Indre et Loire sur jeunes aspergeraies et en Loir et Cher. Dès l'apparition des premiers symptômes, l'intervention est à effectuer avec l'un des produits proposés dans le bulletin n° 12 du 1er Juin 1994.



direction régionale de l'agriculture et de la forêt

ARBORICULTURE : 250 F
VITICULTURE : 220 F

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX CENTRE
93, rue de Curambourg - BP 210 - 45403 FLEURY LES AUVERAIS Cedex



POIREAU

Teigne :

Le vol se poursuit : 7 captures à Cormeray (41), 1 à Braslou (37). Les premières attaques sur plants sont visibles dans le Loiret. Les températures élevées favorisent une éclosion rapide. Les interventions sont à réaliser entre le 18 et le 20 Juin sur poireau d'été ou sur poireau en semis direct.

Rouille :

De nombreuses pustules sont observées sur 50 % des pieds de poireaux proches de la récolte à La Riche (37) et sur plants à Périgny (77). Aucune intervention n'est à réaliser au stade "récolte". Sur jeunes plants, intervenez rapidement avant plantation pour réduire l'inoculum.

CHOUX-FLEURS

Pucerons :

Des colonies de pucerons cendrés et de pucerons verts sont toujours présentes à Périgny (77) et à La Riche (37). Maintenez la protection de vos cultures.

Mildiou :

Des débuts d'attaque sont enregistrés dans l'Indre et Loire et la Seine et Marne. Le traitement préventif est assuré dès la levée ou à l'apparition des premiers foyers avec les produits du tableau suivant :

CHOU : Traitement de parties aériennes

MILDIOU

Matière Active	Spécialité	Dose/Ha
chlorothalonil	Nombreuses	
cuivre de l'oxychlorure de cuivre	UMUCUIVRE MICRONISE	5,0 kg
cuivre du sulfate	BOUILLIE BORDELAISE CARRE VERT	12,5 kg
	BOUILLIE BORDELAISE SOVILO	12,5 kg
thiophanate-methyl	PELT 44 LIQUIDE	1,8 l
cymoxanil et mancozebe	REMILTINE	3 kg
	REMILTINE PEPITE	3 kg
cymoxanil et mancozebe	PULSAN	2,5 kg
et oxadixyl	PULSAN PEPITE	2,5 kg

CAROTTE

Mouche de la carotte :

L'intensité du vol est plus faible dans tous les secteurs de piégeage. La protection doit être suspendue actuellement jusqu'à la reprise du prochain vol.

Alternariose :

Alternaria dauci

Les petites taches brun foncé sont observées sur les feuilles âgées à Tigy et Sigloy (45). La maladie est souvent favorisée par les arrosages le soir. Le traitement est réalisé avec ROVRAL Aqua Flo à 1,5 l/ha, ROVRAL Flo à 1,5 l/ha.

POMME de TERRE

Mildiou :

Des taches sont observées dans plusieurs endroits (Orléans -45-, Val de Loire). Les contaminations du 5 au 8 Juin ont vu leurs taches sortir du 10 au 15 Juin. L'épidémie se poursuit. Maintenez la protection avec un pénétrant ou un systémique.

MAIS DOUX

Pyrale du maïs :

Les premières nymphoses ont commencé depuis la semaine dernière :

- 39 % à Tours (37),

- 15 % à Fleury les Aubrais (45).

Les premiers adultes sont sortis en cage d'élevage à Tours (37). La poursuite du vol sera suivie dans les semaines à venir.

INFO FLASH

Limaces : De nombreux dégâts dans les cultures de plein champ. Renouvelez régulièrement les interventions (45, 37, 77).

Mouches mineuses : Elles attaquent de nombreuses cultures en Seine et Marne, Indre et Loire sur céleri et salades.

Betterave rouge : La Ramulariose attaque les cultures sur St Benoît/Loire (45) et Argent/Sauldre (18).

Salade : Des attaques localisées d'Anthracnose à Milly la Forêt, Vaux le Pénit (77) et St Florent le Jeune (45). Maintenez la protection jusqu'au stade "16-18 feuilles" contre la Sclerotiniose à Gien (45) et le Bremia.

Radis : Toujours de nombreux dégâts d'Altises à Périgny (77).

Melon : Des taches de Cladosporiose apparaissent sur les cultures sous abris (Indre et Loire).

Oignon : La grave attaque d'Artéroporiose sont présentes sur oignon d'hiver à Bonné (45).